

סוג הבדיקה: א. בגרות לבתי ספר על-יסודיים  
ב. בגרות לנבחנים אקסטרנרים.  
מועד הבדיקה: קיץ תשע"ג, 2013  
מספר השאלה: 656, 036201  
נספח: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל-5 י"ל

## פיזיקה מכניקה, אופטיקה וגלים

لتלמידי 5 יחידות לימוד

### הוראות לנבחן

- א. משך הבדיקה: שעתיים וחצי (150 דקות).
- ב. מבנה השאלה ופתחה הערכה: בשאלון זה שני פרקים.
- |             |   |                       |
|-------------|---|-----------------------|
| פרק ראשון   | — | מכניקה                |
| פרק שני     | — | אופטיקה וגלים         |
| <u>סה"כ</u> | — | <u>100 נקודות</u>     |
| 75 נקודות   | — | 25×3 —                |
| 25 נקודות   | — | 12 $\frac{1}{2}$ ×2 — |
- ג. חומר עזר מותר בשימוש: (1) מחשבון.  
(2) נספח נוסחאות ונתונים בפיזיקה המצורף לשאלון.
- ד. הוראות מיוחדות:
- (1) ענה על מספר שאלות כפי שה提בקשת. תשובה לשאלות נוספת נספוחות לא ייבדקו (התשובות ייבדקו לפי סדר הופעתן במחברת הבדיקה).
  - (2) בפתרון שאלות שנדרש בהן חישוב, רשום את הנוסחאות שאתה משתמש בהן, כאשר אתה משתמש בסימן שאינו בדף הנוסחאות, כתוב במילים את פירוש הסימן. לפני שאתה מבצע פעולות חישוב, הצב את הערכים המתאים בנוסחאות. רשום את התוצאה שקיבלת ביחידות המתאימות. אידרישום הנוסחה או אי-יביצוע הצבה או אידרישום יחידות עלולים להפחית נקודות מהציון.
  - (3) כאשר אתה נדרש להביע גודל באמצעות נתוני השאלה, רשום ביטוי מתמטי הכולל את נתוני השאלה או את חלוקם; במידת הצורך אפשר להשתמש גם בקבועים בסיסיים, כגון תואצת הנפילה החופשית  $g$  או קבוע הכבידה העולמי  $G$ .
  - (4) בחישובך השתמש בערך  $s/m = 10$  לתואצת הנפילה החופשית.
  - (5) כתוב את תשובה רק בעט. כתיבה בעיפרון או מחיקת בטיפקס לא יאפשרו ערעור. מותר להשתמש בעיפרון לסרטוטים בלבד.

כתב במחברת הבדיקה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתב בטויטה (ראשי פרקים, חישובים וכדומה). רשום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבדיקה עלול לגרום לפסילת הבדיקה!

הנחהיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות לנבחנים אחד.  
**בהצלחה!**


## השאלות

### פרק ראשון — מכניתה (75 נקודות)

ענה על שלוש מהשאלות 1-5.

(לכל שאלה — 25 נקודות; מספר הנקודות לכל סעיף רשאי רשות בסופו.)

1. הגраф שלפניך מתרגם את מקומן של שתי סירות, א' ו-ב', כפונקציה של הזמן.  
הסירות נעות במסלולים ישרים מקבילים.



- א. הגדר את המושג "מהירות ממוצעת". (5 נקודות)

היעזר בגרף וענה על הסעיפים שלפניך.

- ב. הסיווג שטויות במשך s = 230. קבע אם במשך פרק הזמן זהה המהירות ממוצעת של סירה א' גדולה מן המהירות ממוצעת של סירה ב, קטנה ממנה או שווה לה.  
نمוק את קביעתך.

(4 נקודות)

החל מהרגע s = t = 150 s ועד הרגע s = t = 230 s נעה בתאוצה קבועה.

- ג. האם התאוצה חיובית או שלילית? نمוק. (5 נקודות)

- ד. חשב את גודל התאוצה של סירה ב החל מהרגע s = t = 150 s. (5 נקודות)

- ה. סרטט במחברתך גרף מדויק של מהירות סירה ב כפונקציה של הזמן, בפרק הזמן, המתוואר בגרף הנתון.

ציין על הגרף שרטטת את המהירות הסופית של סירה ב הגיעו אליה.

(6 נקודות)

2. גוף נופל ממנוחה מראש מגדל גובה. גודלו של כוח החיכוך עם האוויר נתון על ידי הביטוי  $f = kv^2$ .

א. הוא קבוע תלוי במאפייני הגוף, ו הוא מהירות הגוף.

א. מה הן היחסות של  $k$ ? (4 נקודות)

ב. הגדר מהי "נפילה חופשית", וקבע אם תנועת הגוף הנתון היא נפילה חופשית.

נקא את קבועך.

(5 נקודות)

ג. סרטט במחברתך תרשימים של כל הכוחות הפועלים על הגוף במהלך נפילתו, והסביר

בעזרתו מדוע יתכן שהחל מרגע מסוים הגוף נע בנסיבות קבועה. (6 נקודות)

נתון:  $k = 0.25$  (ביחסות שחייבת בסעיף א).

$$m = 10 \text{ kg}$$

החל מרגע מסוים הגוף נע בנסיבות קבועה.

ד. חשב את גודל המהירות הקבועה של הגוף מרגע זה. (5 נקודות)

ה. סרטט במחברתך גраф של מהירות הגוף כפונקציה של הזמן, מרגע שחרורו של הגוף

עד רגע פגיעתו בקרקע. בgraf זה אל תציין ערכיהם על ציר הזמן. (5 נקודות)

/המשך בעמוד 4/

3. א. מכונית הנוסעת ב מהירות  $v_0$  על כביש ישר ואופקי מתחילה לבلوم בתאוצה קבועה שגודלה  $a$ , ועצרת לאחר שעברה  $\ell$  מטרים.

פתח ביטוי המקשר בין ריבוע המהירות של המכונית  $(v_0^2)$  לבין מרחק הבלימה  $\ell$ .  
(5 נקודות)

ב. בפעם אחרת המכונית נסעת באותו כביש ב מהירות כפולת ( $2v_0$ ), ובולמתה באותה תאוצה קבועה,  $a$ .  
חשב פי כמה השתנה מרחק הבלימה בפעם זו,יחסית למרחק הבלימה המקורי,  $\ell$ .  
(5 נקודות)

לקראת החורף הוחלפו צמיגי המכונית, כדי שהמערכת למניעת החלקה תאפשר בלימה בתאוצה גדולה פי 1.5 מההתאוצה הקבועה  $a$ .

ג. המכונית נסעת ב מהירות המקורית,  $v_0$ . חשב פי כמה השתנה מרחק הבלימה בפעם זו יחסית למרחק הבלימה המקורי,  $\ell$ .  
(5 נקודות)

נתון כי המהירות המקורית של המכונית היא  $v_0 = 15 \frac{m}{s}$ , והמסה שלה היא  $m = 1500 \text{ kg}$ .  
ד. חשב את הכמות הכוללת של האנרגיה שהפכה לחום, במהלך הבלימה המתוארת בסעיף א.  
(5 נקודות)

ה. שקול הכוחות הפועלים על המכונית במהלך הבלימה הוא קבוע, וגודלו  $N = 3000 \text{ N}$ .  
חשב את מרחק הבלימה המקורי,  $\ell$ .  
(5 נקודות)


.4.a. ניוטון כתב את החוק השני באמצעות הגדל "כמויות התנועה",  $m\ddot{\vec{r}} = \dot{\vec{p}}$ .

$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = m\ddot{\vec{r}}$$

הראה שכאשר מסת הגוף קבועה:

(4 נקודות)

במשחק טניס מהירותו של הבדור משתנה בהשפעת הכוח שהמחבט מפעיל עליו. הגרף של פניר מתאר את גודל הכוח שהמחבט מפעיל על הבדור, כפונקציה של הזמן, במהלך חבטה אחת של שחקן טניס.



היעזר בגרף וענה על סעיפים ב ו.ג.

b. חשב בקירוב את גודל השינוי שחל בתנועה הבדור בעקבות חבטת המחבט. (6 נקודות)

נתון: מסת הבדור היא  $m = 0.06 \text{ kg}$

השחקן חובט אופקי בבדור הנע כלפי מעלה במהירות של  $v = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ .

g. חשב את מהירות הבדור (גודל וכיוון) מיד לאחר החבטה. (6 נקודות)

כדו-טניס מגע לרצפה במהירות אנכית  $v_1 = 12 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ , וחזור כלפי מעלה

במהירות אנכית  $v_2 = 12 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ .

לכל אחד מההיגדים (1)-(3) קבע אם הוא נכון או לא נכון.

נק את קביעותיך.

(1) התנועה של הבדור והתנועה של כדור הארץ השנייה.

(2) התנועה של הבדור השנייה, ואילו בתנועה של כדור הארץ לא חל שום שינוי.

(3) התנועה והאנרגיה הקינטית של הבדור השנייה.

המשך בעמוד 6/

(6 נקודות)

5. מושגים לוויין לחלל באמצעות רקטה.

על פון השיגור מסת הרקטה עם הדלק והלוויין היא  $M = 7.3 \cdot 10^5 \text{ kg}$ . הכוח המרבי שהמנוע מפעיל בזמן השיגור הוא  $F = 1.16 \cdot 10^7 \text{ N}$ .

א. סרטט במחברתך תרשימים של הכוחות הפועלים על הרקטה בזמן השיגור. הנח שהתנודות האויר זינחה. (4 נקודות)

ב. הרקטה ניתקה מכון השיגור ברגע  $t = 0$ . מרגע ההינתקות המנוע מפעיל את הכוח המרבי, חשב את תאוצת הרקטה ברגע ההינתקות. (4 נקודות)


ג. (1) הסביר בקצרה את עקרון הפעולה של מנוע רקטי.

(2) בהנחה שהכוח  $F$  קבוע במהלך השניות הראשונות, קבע אם בפרק הזמן זהה התאוצה גדולה, קטנה או לא משתנה. نمוק את קביעתך.

(6 נקודות)

ברגע מסוים הלוויין מתנתק מהרקטה, וממשיר לנوع בהשפעת כוח הכביד של כדור הארץ.

ד. בתרשים ש לפניך מוצג המסלול הקבוע של הלוויין, שצורתו אליפסה (התרשימים אינם מסודרים בקנה מידה). הלוויין נע סיבוב כדור הארץ בכיוון השעון.



העתק את התרשימים למחברתך, וסמן עליו חצים המיצגים את:

(1) וקטור מהירות הלוויין, בכל אחת מהנקודות B ו D.

(2) וקטור התאוצה של הלוויין בנקודה A.

(3) וקטור הכוח השקול הפועל על הלוויין, בכל אחת מהנקודות C ו E.

הסביר את שיקוליך.

(8 נקודות)

ה. קבע באיזו משתי הנקודות A ו E מהירות הלוויין היא מרבית. نمוק את קביעתך.


(3 נקודות)

## פרק שני – אופטיקה וגלים (25 נקודות)


ענה על שתיים מהתוצאות 6-8.

(לכל שאלה –  $\frac{1}{2}$  נקודות; מספר הנקודות לכל סעיף רשאי בסופו.)


6. אדם המרכיב משקפיים עם עדשות מרכזיות זהות רואה בעזרתם את הדמות המדומה של עצם.  
 א. הסבר את המושגים "דמות ממשית" ו"דמות מדומה". בהסברך תוכל להיעזר בתרשיים.  
 (3 נקודות)
- ב. בתרשימים א-ג שלפניך החץ AB מייצג את העצם.  
 קבע איזה תרשימים מתאימים לתיאור שבפטיח. נקק את קביעתך. (4 נקודות)



תרשים ב



תרשים א




תרשים ג

- ג. עוצמת העדשה היא 2 דיוופטריות. מהו רוחק המוקד של העדשה? (2 נקודות)
- ד. המרחק בין הדמות לעדשה הוא 60 cm. חשב את המרחק בין העצם לעדשה.  
 (3  $\frac{1}{2}$  נקודות)

.7

ABC מסמן חתך של מנסרה משולשת שווה שוקיים, בעל זוויות ראש  $\alpha = 40^\circ$ . המנסרה עשויה זכוכית.

אלומת דקה של אור לבן פוגעת במנסרה בנקודת לדוף AB. לאחר יציאת האלומה מהדוף AC, אפשר לראות כי האלומה מתפצלת לכל צבעי הקשת.



א. מהי זוויות הפגיעה של האלומה בדוף AB? (2 נקודות)

ב. תלמידים דנו בשאלת: באיזה מקום במנסרה מתפצלת אלומת האור?

נור טענה: האלומה מתפצלת במעבר דרך הדוף AB ובמעבר דרך הדוף AC.

אלכס טען: האלומה מתפצלת בהדרגה תוך כדי המעבר במנסרה.

אבטה טען: האלומה מתפצלת במעבר דרך הדוף AC בלבד.

מי מהתלמידים צודק? נמק את תשובתך. (3 נקודות)

ג. מקדם השבירה של המנסרה לאור אדום הוא  $n = 1.513$ .

חשב את זוויות השבירה של האור האדום ביציאה מן המנסרה. (3 נקודות)

ד. קבע אם מקדם השבירה של המנסרה לאור סגול גדול ממוקדם השבירה שלו לאור אדום,

קטן ממנו או שווה לו. נמק את קביעותך. ( $\frac{1}{2}$  2 נקודות)

ה. ציין תכונה פיזיקלית אחד המבדילה בין אור אדום לאור סגול. (2 נקודות)

.8

כאשר פורטים על מיתר מתוח של גיטרה, נוצרים גלי רוחב המתקדמים על המיתר.

א. הסבר בקצרה מהו הבדל בין גלי רוחב לגלי אורך. הבא דוגמה לכל אחד מסוגי הגלים.

(3 נקודות)

ב. על מיתר מתוח יוצרים גלים בתדרות  $f = 500 \text{ Hz}$ . מהירות ההתקדמות של הגלים על

المיתר היא  $400 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ .

חשב את אורך הגל של הגלים. (3 נקודות)

כאשר שני הקצוטות של המיתר המתוח (המתואר בסעיף ב) קבועים במקומות, מתרחשת סופרפרזיציה של הגלים הנעים על המיתר עם גלים המוחזרים מהקצוטות. בעקבות זאת נוצר על המיתר גל עומדים שבו שני הקצוטות הם נקודות צומת (מינימום), ומרכז המיתר הוא נקודת קמר (מקסימום) יחידה.

ג. חשב את אורך המיתר. (2 נקודות)

ד. הגדילו את התדריות של הגל עד שנוצר שוב גל עומדים.

(1) חשב מהי תדריות זו.

(2) כמה נקודות צומת התקבלו על המיתר (כולל הקצוטות)?

(4 נקודות)

## בצלחה!

זכות היוצרים שמורה למינית ישראל  
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

